



Patiënteninformatie

"Hartcatheterisatie"

1. Het onderzoek vindt plaats in het H. Hart van Roeselare (kan eventueel ook in Brugge, Gent, Leuven of Aalst doorgaan). U wordt daartoe een half uur voor uw afspraak met een ambulance naar dit ziekenhuis vervoerd. De kosten voor dit vervoer zijn vervat in uw verblijfskosten in ons ziekenhuis. Vergeet alvast niet uw SIS-kaart en, indien u hierover beschikt, uw kaart van de hospitalisatie-verzekering mee te nemen.
2. Omdat tijdens het onderzoek contraststof wordt ingespoten die soms misselijkheid kan veroorzaken, dient u voor dit onderzoek nuchter te blijven. U mag 's morgens wel met een weinig water (1/2 glas) uw ochtendmedicatie innemen. Voor uw vertrek wordt een infuus in uw linker arm geplaatst.
3. Na een korte wachttijd zal u de onderzoeksruimte binnengaan. De verpleegkundige legt u met de rug op een onderzoekstafel. Boven de tafel ziet u een camera die heen en weer zal bewegen. Dokters en verpleegkundigen dragen maskers, mutsen en gekleurde schorten. De verpleegkundige bevestigt metalen plaatjes aan uw handen en voeten. De dokter kan hierdoor op een scherm uw hartritme volgen.
4. Het onderzoek wordt via een catheter in de lies of soms in de arm uitgevoerd. Desgevallend zal de onderzoekende arts u hierover meer informatie bezorgen.
5. De verpleegkundige ontsmet uw lies. U voelt de koude en natte ontsmettingsstof. De dokter verdooft de huid. U krijgt een branderig gevoel op de plaats van de verdoving.
6. De dokter prikt de slagader aan. Dit is normaal gezien volledig pijnloos.
7. De dokter brengt nu de catheter in een schuift deze op tot in het hart. Soms voelt u wanneer de catheter in de hartkamer is, wat hartkloppingen. Ook dit gevoel is volledig normaal.
8. De dokter meet de drukken in het hart. Daarna vraagt hij u om diep in te ademen en spuit hij de contraststof in terwijl de röntgenopnames van het linkerhart gemaakt worden. U krijgt een fel warmtegevoel dat opkomt in het hoofd en afzakt naar de voeten. U kan plots het gevoel krijgen dat u aan het urineren bent. Dit gevoel houdt slechts enkele seconden aan.
9. Vervolgens wordt de catheter ter hoogte van de rechter en achteraf de linker kransslagader gebracht om deze te filmen. U kan pijn in de borstkas en de rug voelen. Soms hebt u de neiging om te hoesten, maar u mag dit slechts doen na uitdrukkelijke toestemming van de dokter. Daarna vraagt de dokter u weer om diep in te ademen en spuit hij contraststof in.
10. Na het onderzoek verwijdert de dokter de catheter. Daarna drukt de verpleegkundige gedurende 15 minuten na. U kan rugpijn hebben doordat u een tijdje op een harde onderzoekstafel gelegen hebt.
11. Na het onderzoek dient u op een brancard vervoerd te worden naar ons ziekenhuis waar u gedurende ongeveer 6 uur in bed dient te blijven. Op de insteekplaats wordt tot 's avonds een spannend verband en zo nodig een ijszakje aangebracht. U bent normaal binnen de 3u volgend op uw onderzoek terug in ons ziekenhuis.