



Patiënteninformatie

"Transrectale Prostaatbiopsie"

Wat is een prostaatbiopsie?

De uroloog neemt tijdens een prostaatbiopsie één of verschillende stukjes weefsel van uw prostaat weg voor microscopisch onderzoek.

Enkele praktische afspraken

Deze ingreep gebeurt ambulantly en onder eventuele lokale verdoving, doorgaans op de consultatie of in combinatie met een cystoscopie waarbij de ingreep dan doorgaat op de scopie-afdeling in het operatiekwartier. Na het onderzoek mag u het ziekenhuis verlaten.

Als u bloedverdunnende medicatie neemt (bv. Marcoumar) of frequent aspirines inneemt, overlegt u best met de arts hoe uw medicatie aan te passen omdat deze medicatie, bij het wegnemen van een biopsie, soms aanleiding kan geven tot een langdurig bloedverlies.

Vorbereiding voor opname

Wanneer de ingreep los van de consultatie gebeurt en gecombineerd wordt met een cystoscopie, wordt u vooraf administratief ingeschreven in de opnamedienst. Uw persoonlijke gegevens worden samen met uw mutualiteitsgegevens adhv uw SIS-kaart en ev. klevers geregistreerd. Er wordt een afspraak met u gemaakt. Zo u voorafgaand niet werd ingeschreven, gebeurt dit na uw aankomst in het ziekenhuis. Indien het onderzoek wordt uitgevoerd op de consultatie, wordt alle administratie door de specialist geregeld.

De dag van uw onderzoek dient u zich niet nuchter aan te melden in het ziekenhuis. Indien u medicatie dient te nemen, mag u deze met een glas water innemen tenzij uw arts het anders vermeldde. Meestal wordt met de biopsie ook een antibioticum voorgeschreven om infectie te vermijden.

Vorbereiding en onderzoek

De uroloog zal het onderzoek uitvoeren via een echografie. Dit is een toestel waarmee door uitgezonden geluidsgolven (dus geen RX-stralen) die opnieuw worden teruggekaatst en via een computer verwerkt worden, een orgaan in beeld gebracht kan worden. De uroloog brengt daartoe een vooraf met glijmiddel ingewreven buis via de anus in de endeldarm waarna hij de prostaat in beeld brengt op zijn toestel. Een naaldje wordt door deze buis geschoven tot tegen de darmwand tegen de prostaat aandrukt. De prostaat wordt nu via deze darmwand aangeprikt. Dit veroorzaakt geen of nauwelijks pijn. De uroloog neemt bij een prostaatbiopsie verschillende dunne, cilindervormige stukjes weefsel (biopten) weg voor microscopisch onderzoek. Het totale onderzoek duurt een half uurtje.

Nazorg

Complicaties van het onderzoek komen uiterst zelden voor.

Na het onderzoek moet u veel drinken zodat u de drang krijgt tot plassen. Het kan zijn dat er thuis bij de urine een licht bloedverlies optreedt en uw urine rood verkleurt. Een 2-tal liter water per dag drinken spoelt uw blaas voldoende om de urine minder bloederig te maken.

Als uw urine extreem bloederig blijft na een 2-tal dagen, wat zelden voorkomt, kunt u het beste contact opnemen met uw uroloog.

Omdat alcohol een nadelig effect heeft op de bloedstolling, mag u de eerste 3 dagen na het onderzoek geen alcohol drinken. U vermijdt best koffie. Het wondje heeft de tijd nodig om tot rust te komen. Geslachtsgemeenschap wordt daarom best een week uitgesteld. De eerste keren kan uw sperma een roestbruine verkleuring vertonen die normaal is en vanzelf weer zal verdwijnen.

Tevens kan er bloed bij de ontlasting zitten, ook dit is over het algemeen onschuldig en verdwijnt spontaan.

Besluit

Hebt u na het lezen van deze folder noeg vragen over de ingreep? Aarzel dan niet om te bellen naar het secretariaat orthopedie of naar het dagziekenhuis. Mocht u om dringende redenen uw afspraak niet na kunnen komen, dan verwittigt u zo spoedig mogelijk de opnamedienst. Er kan dan ook onmiddellijk een nieuwe afspraak gemaakt worden.

Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij:

Uw Uroloog:

051/33.41.11