





Arthrografie

MR - Magnetische Resonantie

Topzorg dichtbij huis.

 St-Jozefs
kliniek
Izegem

Geachte patiënt,

Deze folder informeert u over het verloop en de gevolgen van het onderzoek dat door uw behandelende arts voorgeschreven is.

De dag van het onderzoek brengt u uw aanvraagbriefje mee naar de dienst radiologie, tenzij dit eerder al via digitale weg aan ons werd bezorgd.

Voorzie maximaal 1.5 uur voor dit onderzoek.

1. Voorbereiding

Dit onderzoek vereist van u geen speciale voorbereiding.

Vertel ons voor het onderzoek of u overgevoelig bent of bent geweest voor genees- of contrastmiddelen.

Tijdens dit onderzoek wordt u blootgesteld aan radiogolven en aan een sterk magnetisch veld. Indien u (vermoedelijk) zwanger zou zijn, gelieve dit zeker voor de start van het onderzoek te melden aan de verpleegkundige.

Een ander aandachtspunt is dat bepaalde implantaten, apparaten of voorwerpen niet meer correct zouden werken na contact met dat sterk magnetische veld. De vragenlijst die u moet invullen voor de start van het onderzoek zal ons helpen eventuele contra-indicaties vast te stellen.

Als het onderzoek kan doorgaan, zal u zich gedeeltelijk moeten uitkleden om veilig de MR ruimte te kunnen betreden.

2. Procedure

Dit onderzoek verloopt in 2 delen:

DEEL 1 ARTHROGRAFIE

Afhankelijk van de probleemstelling onderscheiden we 2 mogelijke procedures voorafgaand aan de MR scan. De radioloog beslist welke procedure in uw situatie aangewezen is.

1) Intra- articulair inspuiting

U wordt verzocht neer te liggen op onze röntgentafel met ontbloot gewricht. Zo nodig wordt een deel van de lichaamsbehaaring afgeschoren, waarna we het lichaamsgewricht ontsmetten zodat steriel kan gewerkt worden.

Er wordt door de radioloog een kleine hoeveelheid contraststof op steriele wijze in de gewrichtsruimte ingespoten. Dit kan lokaal wat pijn veroorzaken, maar valt over het algemeen goed te verdragen.

Na inspuiting wordt de naald verwijderd en moet u nog een aantal keer het gewricht bewegen, zodat de contraststof goed verdeeld is in het gewricht. Vervolgens neemt de verpleegkundige nog enkel controle-opnames.

2) Intra- veneuze inspuiting

Kort voor aanvang van de MR scan wordt via een ader in uw arm, een kleine hoeveelheid contraststof ingespoten. Na het verwijderen van de naald, moet u voor beeldvorming van de schouder, het schoudergewricht bewegen, zoals de verpleegkundige u zal voortonen.

Deel 2: MR scan

Na deel 1 wordt een MR scan gemaakt van het gewricht waarbij met behulp van de ingespoten contraststof alle structuren in het gewricht optimaal in beeld gebracht worden.

Het contrastmiddel verdwijnt vanzelf uit uw lichaam.

De MR scan duurt ongeveer 15 minuten. Er worden gedurende die tijd verschillende scans gemaakt van uw gewricht. U moet tijdens de scan heel erg stilliggen, de minste beweging kan een storing veroorzaken in het beeld waardoor de scan moet hernomen worden. U zult wat gefixeerd worden waardoor het stilliggen wordt vergemakkelijkt. Daarnaast krijgt u ook een alarmknopje en een koptelefoon om gehoorschade te vermijden.

3. Nazorg

Na het onderzoek kan het gewricht wat stijf aanvoelen.

U hoeft zich daar geen zorgen over te maken; dit is immers te wijten aan de contraststof die nog even aanwezig is in het gewricht.

U mag direct na het onderzoek weer bewegen maar vermijdt het gewricht extra te belasten. Bijvoorbeeld: geen ramen wassen in geval van arthrografie van het schoudergewricht.

4. Het resultaat

Het resultaat van het onderzoek verneemt u van uw behandelende arts.

5. Kostprijs

De factuur van dit onderzoek wordt u later toegestuurd.

6. Planning van uw onderzoek

Gezien het onderzoek uit 2 delen bestaat en bij het maken van de afspraak nog niet altijd geweten is, hoe het onderzoek exact zal uitgevoerd worden (intra-articulair versus intraveneus) is het belangrijk dat u op tijd komt.

Kom dus minimaal 20 minuten voor het tijdstip van uw MR afspraak aan op dienst radiologie.

Belangrijk

Als u zwanger bent, of denkt te zijn, geef dat dan voor het onderzoek door aan de verpleegkundige.

Het contrastmiddel dat u krijgt toegediend, heeft geen invloed op eventuele geneesmiddelen, die u gebruikt.

Een infectie is een mogelijke, maar zeer zeldzame complicatie.

Meent u vooraf nog onvoldoende geïnformeerd te zijn of ondervindt u na de procedure aanhoudende klachten, dan neemt u best contact met de radioloog via ons secretariaat of met uw behandelend geneesheer of huisarts.

Wenst u meer informatie betreffende stralingsdosis en de gevolgen raadpleeg de website van het ziekenhuis of vraag de behandelende arts voor de uitgebreide folder over röntgenstralen.

Wij wensen u een behouden thuiskomst.
Dienst radiologie.

7. Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij :

Dienst radiologie - straat 28
Telefoonnummer : 056 63 44 58
radiologie@sjki.be

Openingsuren :

Maandag– vrijdag
7u45 - 12u30
13u30 - 18u

vzw Sint-Jozefskliniek

Ommegangstraat 7 - 8870 Izegem - België | E. info@sjki.be | T. 056/ 63 46 46 | www.sjki.be | **Spoedopname:** T. 056/ 63 43 07

